不孕自療法（八）

朱振聲

近人之求孕談片

（一）求孕術

人苟非別出於生理之外。如男子天宦。婦人石女。雌雄人。或交骨不開。與畢生無月經者。天下斷無不父之男。亦斷無不母之女。然亦有生理健全。亦無疾病障礙。而久年不育。或畢生無育。此其何故也。余曰。生育之力。養於平時。結胎之功。在於一睽那間。其平時不能養其生育之力。而一睽那間又不能合法。是以無子也。而世人皆不於生育原理中着想。以爲生男育女。是有天數。不能苟且卽得。於是求神問鬼。拜佛燒香。種種癡舉。令人可憐。其稍有知識者。則以爲我之不能生育。在於精神之不健。身體之不充。於是廣服藥餌。以壯其陽。其富有之家。不能生育。則咎在婦人。於是廣求姬妾。以冀一育。如此之流。亦難悉數。總之彼等之所以作此舉動。以爲定能得子。不知求子之心愈切。而子愈不能得。天地之生萬物。無心而成化。不期然而然之事。非可以強求也。不問生育之原理。一味妄舉。詎之強求。余每見強求不得之人。往往釀成神經病。陰虧腎癆等症。可不悲哉。余不辭簡陋。爰錄中國胎生學數則。以作明微焉。（一）靈素生理新論云。易曰。男女媾精。萬物化生。以是知萬物之化生。固無一而非此一點精氣爲之也。此一點精在植物中。則爲果中之仁。在動物則爲精中之蟲。男子之精蟲。與女子之卵種。乘交合之機會。而互相凝合。停留子宮。漸次發育。遂成胚胎。（二）中國生理學補正云。不先不後。剛剛奏拍。男精之射未已。女氣之攝已固。精於是乎精。胎於是乎結。

以上二說。一則曰。精氣。一則曰。不先不後。剛剛奏拍。反而言之。卽精氣不充者。不能生育。交不合法者。不能生育。可以明矣。何以言之。當男子於青春之期。苟不能保養精神。以至手淫過度。釀成遺精種種虛弱之症。及至完婚以後。女雖能受。男實不施。蓋精力薄弱。卽不能遠射。不能遠射。安能與卵種凝合。內停子宮而成胚胎哉。女子於青春期內。及至婚後。最易患者。厥惟白帶。久患不愈。則精神衰憊。氣血虧耗。月信不準。及至婚後。男雖能施。女實不受。蓋氣血虧耗。則卵種稀少。卵種稀少。則不能含受精蟲。此精氣不充之謂也。夫所謂交不合法者。列如男女和悅。彼此情動。而後行事。則男施而女受。是以有子。若男情已至。而女心未動。則玉體纔交。瓊漿先吐。陽精雖施。而陰不受。若女情已至。而男志或異。則挑浪徒翻。子門雖開。精無所入。陰陽乖離。遂成天地不交之否。是以無子也。故欲求孕者。首當養精。男子養精之道。首在節慾。女子養精之道。首在調治白帶。保養氣血。故養精二字。實爲求孕之第一要義。至於交合之法。若性情和合。身體壯健。身入其境者。自然臨會。亦不必余之多贅矣。（筠孫）

（二）調經與種子

夫婦人之調經。欲爲懷姙計也。時醫遇調經證治。輒囑之曰疾非易愈。宜多藥恒藥。方可見功。以是患病者每苦之。余意不然。夫藥味至苦。恒人所喜者少。而所惡者多。蓋婦女之患病不一。則治法亦宜各殊。若常染難瘳之症。治之以恒藥。不使間斷。庶幾有效。倘天癸愆期。或作或輟之疾。概以恒藥治之。則服藥者既不堪其苦。且癸水輪至。所患依然不減。漸引起其厭藥之心。反咎醫方之不驗矣。故余意治斯病者。必囑患者俟癸臨之際調之。察其癸之先後腹痛等因。見病而治。每月以五六劑。多至不逾十劑。俾服藥者。不覺其煩且厭矣。如是者調治三四月。多至五六月。每經行之時。另服種子散。則女無不孕矣

（附錄種子散方）陳蓮蓬十枚炒炭研末。分三四服。逢天癸臨期一二日。用陳酒沖服。每月一服。三月後可冀懷姙。余屢試屢驗。按蓮蓬性收澀。能斂女子胞。其形口小。逆肉生于內。不得出。取此義也。

（又方）取烏骨雞蛋。每日煮食。俾生子。

（種子煎方）補骨脂。淫羊藿。淡蓯蓉。覆盆子。紫石英。當歸身。粉川芎。厚安桂。蘄艾葉。大熟地。厚杜仲。羌蔚子。蓮蓬灰。大抵種子藥多溫少冷。安胎藥宜涼忌熱。（錫周）

（三）求子與娶妾

大凡人年過四十。膝下猶虛者。莫不嘆伯道之無兒。常思覓桃葉以傳種。此事之必然。亦人之常情。于是量珠十斛。金屋貯嬌。彳亍遊戲之場。訪姝于平康之里。無如北地胭脂。南朝金粉。狎而玩之。婉孌可愛。一旦籠而有之。則野心難馴。卽兩情相契。亦恐秀而不實。卽實。亦非佳果。否則古人胎教之說。不成立矣。諸君不信。請閱十月八日某報所記。西吳某生。娶北里林素娥者八之後。當時甜情蜜意。洽洽融融。無如月圓易缺。彩雲易散。吳生娶八而病瘵。正當奄奄一息之間。正八娘雛雛下地之時。生死。而八娘下堂求去。嬰孩亦卽死。吳生所謂求子。仍是一塲春夢。并聞以受毒過深。胞中精雜。火爍焰焰。致小兒生後。滿身無皮。慘然以死。奉勸諸君。以求子而納寵。勿以妖豔爲美。惟須樸實是求。然小兒初生無皮。亦有一法可治。特爲錄出。以免枉死。法用糯米粉研細。敷小兒周身。以帛裹好。再掘地數尺深。置小兒于潭中。決不露其頭面。約半日取起。哺以乳。則皮生矣。總之男女均無花柳毒者。則所生之小兒。自康健。父母其遺毒。所以小兒生後。凡有胎毒現象。面生瘡疥。以及漆瘡。均受之遺毒。諸毒。欲根本療治。則後之小兒。避免此等症者。須避免羞惡之向醫生處和盤託出。使再孕再育之大人小兒。均得平安。亦何樂而不爲也。（張汝偉）

（四）不姙的療養法

姙娠的結實。其任精液中所包含生活的精蟲。子宮口開發的時候。精蟲就從子宮口裏進去。漸入子宮的腔內。到喇叭管中。他和卵子會合之際。不能斷定在一處。普通論之。在子宮腔。喇叭管中。然則在腹腔以內會合的。是很少的。講到婦人卵巢內的卵子。若不是從內洩出。則斷然難得和精蟲會合。所以必須卵子出巢。入於喇叭管的中間。運到子宮腔裏。正觸其天機。巧相會合。方得受孕啦。但既和精蟲會合的卵。必然變化。得到子宮的粘膜所包。漸次的發育。於是始可得到云及妊娠了。學者有云。世間無嗣的夫婦。百人中占到十五人。這其間的數量。占據的太大了。推考他的原因。不得都歸併在婦女的身上。在男子方面。也未免有的。這個我們暫且放棄了。無庸去理論他。但以婦女不娠的緣故。卽如子宮諸炎證。尤以內膜炎。最爲重要的。他碍於姙娠。非同小可、就是受孕了。也要流產的。如實質炎腹膜炎和月經痛苦等病。或者是喇叭管和卵巢等病。都可斷言他不得姙娠的。是故種子的方法。乃在平日善保她的身體。倘發生子宮和血分等病。平時須自行調養。至若姙娠所關緊要的條約。在下把他繕書在下面。

一　交合後。身體須平伏。不可急動。平臥一時。

二　交合時。婦人必須的仰臥。取合天機。

三　經期前三四日。和經期後六七日。最易受胎。

四　婦女精神不快和春意未興的時候。不可強爲交合。宜和乃夫別寢。保她身體。勿使生殖機關。妄加刺激。（玉人）

（完）

◉一百八十九種痛症之治法（九）

朱振聲

（六十四）脚痛不能踐地

脚痛不能踐地。乃風濕阻滯。血不流行所致。痺症之一也。用松毛（卽松樹之葉）一升。搗如泥。酒三斤。浸七日。每飲一盅。或二盅。日二服。按松毛能行血中之風。腰膝酸痛。及節歷風痛。俱宜服之。

友人趙紀唐之父。足痛不能行。問計於余。教其用松毛燒爲灰炒。乘熱包擦兩足。趙君從余言。二日後痛卽止。步履如常。

（六十五）脚底起泡步履疼痛

行遠路者。足底多受磨擦。易於起泡。以致步履時疼痛不堪。欲免此弊。宜用蘿菔子。炒。研末。和白礬末。鋪於鞋底。卽行遠路。決不起泡。

上海幸福書局出版

書名	冊數	價目
百病自療叢書	十冊	實售大洋一元六角
家庭醫藥常識	一冊	實售大洋八角
婦女病初集	一冊	實售大洋五角
婦女病續集	一冊	實售大洋五角
百病秘方	一冊	實售大洋四角
保腦新書	一冊	實售大洋四角
怪病奇治	一冊	實售大洋一元
花柳病治療學	一冊	實售大洋三角
咳嗽自療法	一冊	實售大洋二角
幸福報第七集彙訂本	一冊	實售大洋一元四角

書名	冊數	價目
虛勞五種	一冊	實售大洋五角
民衆醫藥常識	四冊	實售大洋二元二角
實用驗方	一冊	實售大洋五角
家庭醫藥顧問	一冊	實售大洋二元
國民醫藥須知初集	一冊	實售大洋二元
國民醫藥須知二集	二冊	實售大洋一元八角
遺精廣論	一冊	實售大洋五角
丁甘仁醫案	四冊	實售大洋二元四角
清代醫案精華	四冊	實售大洋二元四角
清代醫話精華	四冊	實售大洋二元四角

書名	冊數	價目
中西醫藥講義	[illegible]	實售大洋八元
醫學南針	二冊	實售大洋一元八角
中國針灸治療學	一冊	實售大洋二元八分
衛生寶鑑	四冊	實售大洋二元五分
衛生叢話二集	一冊	實售大洋四角五分
衛生叢話三集	一冊	實售大洋四角五分
衛生叢話四集	一冊	實售大洋五角
學校衛生要旨	一冊	實售大洋四角五分
失眠自療法	一冊	實售大洋二角
癆瘵自療法	一冊	實售大洋二角

地址上海三馬路雲南路轉角

長壽

于右任

每份四分　第二十四期

中華民國念一年十一月十八日

每逢星期五出版　全年五十期　連郵二元　國外加倍

館址　上海三馬路雲南路口幸福書局內

◉本報特聘請吳之屏方家楨大律師爲常年法律顧問◉

本期目錄

本報以後之方針
伏暑醫療兩鍼
急救吞紅頭火柴
痧痞神方
止血補傷丹
育兒日記（十八）
新傷成癆
虛癆腹脹
治瘋狂病
疾痢自療法（念一）
不孕自療法（八）
一百八十九種痛症之治法（十九）

本館施送良藥

自國歷十一月一日起。先行施送一月。分文不取。以面取爲限。恕不郵寄。逾期出售。

神妙萬應膏藥　凡癰疽發背及一切無名腫毒屢試屢驗其効如神

立止瘧疾膏藥　不論日日間日三日均能奏效

速效黃水瘡散　隨敷隨效百發百中

神効凍瘡膏藥　患凍瘡者不論已潰未潰均能奏效並且立止疼痛

本報定戶注意

本報爲優待全年定戶起見。特向上海醫界春秋社情商大批月刊。分贈各定戶。大約在二星期內。均可收到一冊。如認爲滿意。可向該社定閱全年。

本報以後之方針

分爲二種　（一）篇幅照舊。專載短篇稿件。（二）增加編幅。改印白色報紙。

徵求讀者意見。以便從事革新

本報自出版以來。忽忽已二十四期矣。回顧以前各期之內容。殊未能認爲滿意。自下期起。擬改變方針。惟同人等識見有限。現擬定二種辦法。徵求讀者意見。以便從事革新。

（一）篇幅之大小。紙張之顏色。一律照舊。而內容則專載短篇稿件。取消廣告地位。分門別類。例如婦女病。青年病。小兒病。花柳病。皮膚病。虛癆病之類。其他如實用驗方及醫藥顧問。則仍舊保留。（報費照舊）

（二）增加篇幅。改印白色報紙。仿照新聞報新園林格式。每期出版一大張。內容則中西並重。稿件則長短兼收。惟此種辦法。印工紙張。均須增加。成本既大。不得不登載廣告。以增收入。（報費不加）

以上二種辦法。希讀者於一星期內示知。同人等决服從多數。以定取舍。

同胞注意

▲國術半月刊出版▼

▲徵求定戶▼

敝揚武國術會專以提倡國術爲宗旨，除歡迎同胞加入鍛鍊身體外，並印行「國術半月刊」以便於一般民衆。專載關於國術之論文研究教材要聞統計等。宗旨有四：一，喚起同胞對於國術之興趣；二，普遍國術智識；三，傳授國術無師自通；四，研究國術之深理妙用。完全用白話淺文敘述，內容極其豐富，爲國術界唯一定期刊物！是同胞鍛鍊身體之良好指導，是同胞之康健批發所，是同胞人壽保險公司，已習國術者不可不看，未習國術者尤不可不看！

每年二十四期本埠大洋一元外埠大洋一元三角

上海康腦脫路五八六號揚武國術會啓

接洽處三馬路四川路口江海關二樓國稅委會劉福民

青年男女衛生指南

今之醫界。各科病症。雖皆分別研究。不遺餘力。然獨於青年一科尙付闕如。近世書籍關於青年之修養者。名有數種。而皆從心理學倫理學立論。罕有從醫學上專論青年男女之衛生及修養法者。本書爲武進張贊臣先生採搜各家學說編纂而成。故專從醫學上立論。指導青年男女良善之攝生。及病症之自療。共分兩卷。十二章。上卷爲生理。衛生。結婚之研究。房事問題。月經。血崩。赤白帶。隱疾。夢交。問病。生殖器各症。陽痿。梅毒。下疳與橫痃。等十二章。下卷爲女子美的問題。肝氣。治療。預防。神經衰弱。遺精。淋濁。手淫。衛生諸要點。皆理至透徹。言之綦詳。一束。等八章。子目三百餘則。全書五萬餘言。敍述各種病症之原因。症狀。洵爲青年男女之南針。醫界諸君之良友也。

全書一厚册實價洋一元　特售大洋八角郵費一角

▲總發行所上海西藏路遠東飯店朝南斜對過西洋關弄（卽新改跑馬廳路六十三衖）第二十號中國醫藥書局

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

伏暑醫療南鍼（九）

宋愛人

伏暑病理學總論

▲伏暑證治辨論

本證。有轉瘧。或戰汗之機括。轉瘧則證輕而癒期或有奄纏轉緩。戰汗則證重而或一戰汗出即解。然亦有戰汗後繼之以瘧。瘧蓄作數次而又忽然戰汗而解者。總之邪正相爭。彼入則此出。彼出則此入。必至邪卻正勝而後愈也。新訂達原飲消息之。

薑汁炒川朴　薑汁炒川連　煨草果　炒青皮　宋半夏
薑汁炒竹茹　炒香瓜蔞仁　紫蘇梗　白茯苓　川通草

論伏暑初起兼挾穢惡吐瀉有如痧穢并出治法（三）

穢惡厲毒之氣。最足以繁殖病菌。飛揚天空。混雜溝壑。鼻吸口受。直入中道。能使清濁混淆。氣道痺塞。乘此伏暑內動。同時發作。以致肢冷脈伏。汗出粘膩。上吐下瀉。水液渾臭。舌胎垢膩。病氣滿室。此證邪伏既久。尤易邪侵膜原。以其胃脘中道。鄰近膜原故也。治之之法。當芳淡苦辛以斡旋其胃腸清濁之機。然亦有一時脈脫心弱者。勢非參以薑附強心不可也。連樸定中湯臨時消息之。

重薑汁炒川連　薑汁炒竹茹　白茯苓　廣藿梗　玉樞丹
重薑汁炒川樸　鹽水炙廣皮　方通草　佩蘭葉

論伏暑初起其人臟體陽熱即有瘖瘄喉痧并出治法（四）

伏暑晚發。時逢秋令亢燥。而其人又是臟體陽熱。血分蘊毒頗重者。竟有、或見、瘖、瘄。或見、喉痧。瘖點大而纍。瘄點小而細。瘄須清營。瘖須清胃。其見而未透者。非透不可。大法清營以加減銀翹飲。清胃以加減玉女煎。若身無瘖瘄。但見喉爛。急以清營透痧湯。若瘄粒枯碎。瘖色紫黑。喉爛牙腐。口臭泛噁者。均惡候也。爰擬三方臨時消息之。

加減銀翹飲
銀花　粉丹皮　白杏仁　括蔞根
青連翹　西赤芍　象貝母　白茅根

加減玉女煎
鮮生地　京玄參　青連翹　陳金汁
生石膏　金銀花　西赤芍　飛青黛

犀羚玉女煎。即前方加犀角。羚羊。爲毒火之重者而設也。如不用犀羚。重用紫雪丹亦無不可。

清喉透痧湯
生牛蒡　白杏仁　淨蟬衣　嫩薄荷　青連翹　西赤芍
馬屁勃　象貝母　嫩前胡　金銀花　粉丹皮

論伏暑初起其人臟體陰寒即有便洩肢冷並出治法（五）

便下洩瀉。糞質黃臭。大腹疼痛拒按。脈沉弦搏指或滑沃不暢者。雖見肢冷。亦是熱證。若便尚腥臭。腹不知痛。脈虛欲脫而又汗出肢冷者。便是寒證無疑矣。原因由於臟體陰寒。或生冷食滯。停積胃腸。使脾胃溶解熱度減退。酸素消減。血行沉降。於是便洩肢冷。脈虛欲脫。一派陰寒見證。於伏暑證最爲凶惡。蓋伏邪無論輕重。總要冀其層層透洩。若血行沉降。則透洩爲難矣。急以薑附還陽。參棗救脫。待其利止脈出。再從伏暑證治。若慢以暑濕中惡之吐瀉例而投以連朴蘇霍青皮木瓜等芳開苦洩之劑。是速其斃也。參附救逆湯消息之。

台人參　淡乾薑　炙黑草
生附子　山萸肉　大黑棗

論伏暑邪陷精室男子遺精便濁女子帶下赤白並發明陽電爲燐質陰電爲鐵質及治法（六）

（未完）

實用驗方

本欄歡迎讀者投稿

▲急救吞紅頭火柴

近世生活程度。日見增高。社會情形。日見複雜。無知之人。每圖自盡之下策。吞服紅頭火柴。此物內含燐毒。輕者用綠豆熬湯灌服。重者先用桐油探吐。再服此湯。

▲痘瘄神方

（一）痘方　凡痘初起。身熱喉痛。過三四日而發齊。亟向藥店買紫草茸二錢。用清水一碗。煎至半碗。小兒減半。每日飲此汁三四次。五六日後。痘必結痂。再用舊臘梅油或菜油搽之。即痊可矣。

（二）瘄方　瘄發不透。危險堪虞。小兒正瘄。初次曰正瘄。尤宜注意。急覓屋上陳年貓糞。（按本草曰天松香）愈陳愈佳。擇其乾粘而帶白花者。燒以粗布。視小兒年齡。酌定分量。煎湯服之。立能透發見點。其效如神。平時遇有此種陳年貓糞。收置瓦片上。放於風日之中。以備急需。尤爲方便。

▲止血補傷丹

跌墜毆傷。物壓馬踢。刀箭諸傷。雖至腎子壓出。可用此丹治之。立能止血定痛。幷不忌風。如鬥毆後內傷重者。多則黃酒送服一二錢即可。青腫者。用水調敷患處立愈。價廉功大。治傷如神。其方列后。

生白附子十二兩　白芷一兩
天麻一兩　生南星一兩　羌活一兩
防風一兩

小兒眼睛之保護

育兒日記（十六）　尤學周擬

四日　外子述一有趣而又可憫之新聞。其同事吳君之子。雙目忽盲。此事之發端。在十日以前。是夜。吳君夫婦。情興意濃。敦倫一次。事後。將拭穢之布。壓於褥下。半藏半露。其十歲之子。與父母同寢。晨起。因目多眵。模糊不辨。摸索得半露之布。用以拭目。吳君夫婦。同未知也。午後即覺目中不適。急之洗拭。隔日即現紅絲。尚以爲平常之風火赤眼。用普通眼藥點之。毫無影響。數日紅且腫痛。急專科治療。謂目中傳染淋菌。醫治已晚。有盲目之虞。吳君雖患老白濁。其傳染於目之理。百思不解。探問其子。得拭目之一由。推其時日。正敦倫之夜。恍然大悟。後悔無及。。百治無效。成爲盲者。一生幸福。因以斷喪。可嘆可憐。竊思嬰兒初生。咸具完全雙目。決非生而爲瞽。多由爲父母者。不知保護之所致。以致貽累終身。觀於此。保護小兒眼睛之常識。可以漠視耶。茲得保護眼睛之最要法數則。錄之以供參考。

（一）嬰孩初生。沐浴。務宜留意。勿使污水誤入兒眼。於七日內須細察其有否目疾。若目中微露紅色。用潔布蘸硼酸水。自內眼角順流至外眼角洗畢。點以黃連汁。（黃連二分。用乳汁拌透。飯鍋上燉透。待冷用。）左目有疾。愼防傳至右目。右目愼防傳至左目。

（二）嬰兒所睡之處。勿使逼對亮光。將來可無門睛之病。光線勿從頭頂射來。以免眼睛上竄之弊。（雖見睡眠法。恐遺忘。又特摘出。）

（三）嬰兒患天花、水痘。痲痧。紅痧等症。尤易傷目。須留心其所受之光。有否妨礙目力。

（四）兒童有患爛眼弦及砂眼者。癢時。以手指亂擦。殊不知愈擦愈甚。惟須速即治療爲要。以免損眼珠而生障翳。

（五）兒童玩具不可給以尖銳快利之物。以防刺傷眼睛。如一目既損。他目尤宜保護周到。

（六）兒童體質不健。或體已受先天之毒。尤須格外加意看護。以杜此毒延及目中致傷內筋。

（七）兒童所用之手帕。宜頻洗濯。不潔之布。切勿隨手拉來。爲小兒拭目。

（八）兒童好遊戲。如推砂。拍球。滾彈子等。手指最易染污。用以揉目。易將微生物染入眼內。以成目疾。宜叮囑而常爲之洗手。

（九）兒童目力既弱。燈光之下。不宜過勞。致傷目力。細小之字。及暗淡之燈光。尤宜愼之。

（十）小兒好奇。多喜戴他人之眼鏡。爲父母者宜戒之。如目力果係不足。可配一適度之眼鏡。否則能傷目。不可不愼。

朱振聲醫士

上海新新公司　常年醫藥顧問

診例

（甲）門診一元　號金不收
（乙）出診四元　路遠遞加
（丙）膏丸方四元　隔日取件
（丁）外埠問病二元　原班回件
（戊）急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話九一四九二　掛號處啓

◉本醫室代售各種良藥

保腦丸……專治腦漏……每盒五角
遺精散……專治遺精……每盒一元
白濁丸……專治白濁……每盒一元
神仁丹……專治時疫……每元三瓶
吐血靈丹……專治吐血……每盒五角
獺肝定痛散……專治肝胃氣痛……每盒四角

◉痢疾自療法（二十一）

朱振聲

▲痢疾要方

（一）葛根黃芩黃連湯
（藥品）葛根　黃芩　黃連
（方義）協熱下痢。脈數發熱。喘而汗出者宜此。以葛根能升清而解肌熱。芩連能清內熱。且可燥溼堅腸也。

（二）白荳蔻湯
（藥品）蔻仁　訶黎勒　陳皮　乾姜　厚朴
（方義）主治寒濕停中。脾胃升降失司。嘔吐瀉痢。腹痛而滿。脈沈細弦。苔薄白。以此方有溫運化濕之力也。

（三）枳殼湯
（藥品）枳殼　黃連　甘草　阿膠
（方義）此方治血痢已久。濕熱猶有未清。故方中攻補兼施。

（四）荊防敗毒散
（藥品）荊芥　防風　茯苓　甘草　桔梗　枳殼　柴胡　前胡　羌活　獨活　川芎　薄荷　生姜
（方義）痢挾表邪。而發寒熱者宜此方。冀其邪從表達而瀉痢自止。喻氏所謂逆流挽舟之法也。

（五）白頭翁湯
（藥品）白頭翁　秦皮　黃柏　黃連
（方義）白頭翁有風不動。無風自搖。性味苦寒。合之秦柏連等。主治濕熱壅盛。迫血妄行。大便膿血。脈數苔黃者宜之。虛寒者服之禍不旋踵。

（六）芩芍湯
（藥品）芍藥　當歸　黃芩　黃連　大黃　木香　檳榔　甘草　肉桂
（方義）清濕熱。蕩積滯。和榮理氣。兼有其功。可謂治夏秋濕熱痢之正方。但肉桂爲久痢腹痛甚者設。尋常初起。勿用爲宜。

（七）木香檳榔丸
（藥品）木香　檳榔　青陳皮　枳殼　黃柏　黃連　山稜　莪朮　大黃　黑白丑　香附　芒硝
（方義）以走利三焦之氣通暢。溼熱之積自行。況益以峻速推蕩之藥乎。溼熱積滯之痢初起。乘其正氣未虛。亟宜用此攻之。日久則胃氣敗壞。難爲力矣。

（八）枳實導滯丸
（藥品）大黃　枳實　黃芩　黃連　神麯　白朮　茯苓　澤瀉　加木香檳榔名木香導滯丸。
（方義）此方利氣消積。不若前方之猛。痢疾用此較妥。或加木香檳榔以利其氣。其勢稍烈。

（九）香連丸
（藥品）木香　黃連
（方義）主治痢下內熱口乾。氣阻腹痛。木香辛燥利氣機。黃連苦寒化溼熱。合而爲丸。有相得之妙。腹痛而口不渴者忌服。

（十）桃花湯
（藥品）赤石脂　乾姜　糯米
（方義）大便膿血。小便不利。關閘不固。下焦滑脫。脈微欲絕。此方甘溫固濇。但祗可暫用。痢止即可勿服。以其粘濇之性。防有壅滯之患也。

（十一）溫脾湯
（藥品）大黃　人參　甘草　炮薑　熟附子
（方義）此方主治稍久熱痢赤白。纏綿不愈。攻補兩難。故用溫下之法。虛寒者宜加桂心。重用炮薑附子。減大黃。

（完）

醫藥顧問

本欄問病。以本報之定戶爲限。非定戶而欲問病者。每論一症。須附問病費大洋五角。以示限制。朱振聲醫士答。

▲斲傷成癆

（問）茲有求者。小子不幸七歲喪父。而家貧。家母含辛茹苦。將十指換來之錢。而扶養小子成人。小子得以在小學讀書七年。而有今日者。慈母之心血也。而小子不知體念親心。斲傷身體。大對不起我慈母。小子十四歲求學時。受年長同學之誘。爲手淫戲。日必二三次。時年幼不知其害。如是者三年。方閱書報等。乃知手淫之害。而悔已不及矣。蓋此時已常作微咳。四肢無力。而不思食。頭稍轉即暈。時已去學就商。乃立意戒絕此病。經一年餘方戒絕。而已骨瘦如柴。又因商店內作事甚苦。體日弱。又時作微咳。至晚飯後發燒。每思活亦無益。顧目下米珠薪桂。母老矣。不能再爲人作活。所持者小子之月入八元耳。小子死老母將何以堪。故苟延殘喘者又一年矣。近者又作微咳。而腰微痛。老母不知也。小子月俸八元。老母日夕刻苦數年。積得六十元。欲爲小子娶婦。雖小子再三求其暫緩。而老母欲了向平之願。現已定親。小子今念二歲。而尚未發育。恐已成童癆。不特無延嗣之望。恐亦不久於人世。念及親恩。潸然涕下。未知小子之病。尚有補救之藥否。價昂之補品。又非小子之力所能及。先生如能拯拔之。戴德銜恩。無窮涯矣。（張榮寶）

（答）手淫之害。足下既已知而悔戒。由手淫過度而遺成之虛弱症。得合法之調理。亦不難有復原之日。往者不可諫。來者猶可追。古人之言。不我欺也。足下初爲人誘。而沈溺於手淫者三年之久。已一誤於前。近日咳嗽腰痛。自知已成童癆。而不爲令堂所知。此又一誤也。推足下之意。恐令堂得知病根。惹起隱憂。不欲重傷老母之心。故秘而不宣。不知因循不治。將坐誤時機。病入膏肓。成爲癇疾。此時令堂之心傷。又何如哉。鄙意以爲與其坐誤。養癰遺患。不若直捷明告。速即延醫調治。一誤切不可再誤矣。以足下之病體。服瓊玉膏甚合。各藥肆皆有出售。價亦不貴。久久服之。或可收效。如向就近醫家一診。得醫士證明可服而服之。尤爲穩當。

□虛癆腹脹

（問）內人現年二十八歲。生一子。年四歲。自生子後一年。身體漸瘦。而腹大如孕。故當時不以爲病。去年二月初。請醫診治。始知是病。服藥後不幾日。經血下。腹亦平。然身體日益消瘦。經亦杳然。至七八月間。復請醫診治。經又來。病亦略起色。至拾月間。忽肚腹脹大。寒熱交作。夜間身熱如火。自盜兩汗。頻頻而來。便則糖瀉。即請醫診。據云爲單腹臌脹。服藥二三十貼。至拾二月間。寒熱未除。腫脹難消。因不耐服藥而停醫。然此時尚能行動。飯亦下一二碗。惟經水不來。至今春廢歷歲首。腹脹忽退。乃因寒熱依然。改就西醫。據云爲乾血癆症。服血清等藥。寒熱略減。而自汗反多。腹又脹大。兼及四肢。十天後。汗則時發。面部紅赤。又加氣喘。即再服中藥。以養陰生津利水爲治。已服藥七八貼。火氣似退。寒熱則依然也。現在臥床不能行動。幸無咳嗽。心神尚佳。脈虛細。因病漸入艱境。家人心亂如麻。望先生詳爲指示。（李鍾秀）

（答）語云。風癆臌膈。實病難醫。尊夫人之症。國醫斷爲臌脹。西醫於脹消發熱之際。又證明爲乾血癆。是已兼臌癆二症而有之。得其一已難就痊。況二病俱發乎。腹大肢腫。乃脾虛水泛。面赤氣喘而自汗。虛陽外越之兆。陽虛則外寒。陰虛則內熱。寒熱交作。當調補其陰陽。俾濟於平。

西薯皮四錢　炒白芍錢半　紫丹參錢半（炒）
炙潞黨四錢　五味子七分　淮牛膝三錢
白歸身二錢　煅牡蠣八錢　銀柴胡一錢
生苡仁四錢　金匱腎氣丸五錢（包）
春砂仁八分（次入）

治瘋狂病

心齋

照人年歲。用牛虱若干。研汁。連皮。無灰酒服。立效。如年未及三十者。用虱亦當以三十枚爲度。太少則力薄。余於甘肅。一戚瘋狂。莫制。百藥無效。錮禁空房。後得牛虱方。照法醫治。瘋病即愈。